



MetaGum®

Kiváló észterezettségi fokú metaborkósav és gumiarábikum keveréke a kristálystabilitás meghosszabbítására

Termékismertető

A MetaGum® magas észterezettségi fokú metaborkósav és gumiarábikum keveréke. A két alkotórész - a magas észterezettségi fokú és stabil metaborkósav és a könnyen oldható gumiarábikum - megnövelik a kristálystabilitás idejét. A 934/2019/EU bizottsági rendelet szerint engedélyezett. A nemzeti előírásokat a felhasználónak kell ellenőrizni. Tisztaság és minőség szempontjából bevizsgált termék.

Cél a kristálykiválások - mint a borkő (kálium-hidrogén-tartarát) megakadályozása a borban, továbbá a kristálystabilitás megnövelése magasabb tárolási hőmérsékleten is.

A MetaGum® megátolja a kristályok képződését borkővel túltelített újborokban is. Egyszerű metaborkósav alkalmazása esetén fennáll a veszély, hogy a vegyület többé már nem kristálystabilizáló hatású borkóssavvá esik szét. Ez a bor tárolási idejétől és a tárolási hőmérséklettől függ. A MetaGum®-ot alkotó komponensek speciálisan kialakított, homogén keveréke lelassítja a metaborkósav szétzoredezését. A stabilizálási idő a MetaGum®-nak köszönhetően meghosszabbodik. A stabilizálási idő egzakt meghatározása a különböző boralkotók és a tárolási feltételek miatt csak korlátozottan lehetséges. Közelebbi támpontot a borkőtelítési hőmérséklet meghatározása adhat.

Adagolás

10 g/100 l, maximum 13 g / 100 l.

A MetaGum®-ot 10-20-szoros bormennyiségben kell elkeverni. Néhány perc után újra átkeverve teljesen feloldódik. A teljes oldódást követően adja a borhoz. Az egyenletes eloszlásról a borban keveréssel kell gondoskodni. A MetaGum®-ot minimum 2-3 nappal a bor letöltése előtt kell a borhoz adni. Közvetlenül töltés előtt a bort a MetaGum® és az esetlegesen hozzáadott mustsűrítmény egyenletes eloszlata céljából még egyszer jól át kell keverni. A kezelendő bornak fehérjestaibilnak kell lenni, tehát megfelelő mennyiségű bentonittal, NaCalit® PORE-TEC-kel kell deríteni, mivel a metaborkósav hatására a pH érték megváltozhat.

Erősen instabil boroknál előfordulhat a MetaGum® és más metaborkósav termékek adagolása után egy enyhe és elmúló zavarosodás. Hogy ezt a bizonytalanságot kiküszöbölje, ügyeljen a MetaGum® helyes időben történő adagolására (tehát minimum 2-3 nappal a töltés előtt).

Tárolása

A MetaGum® higroszkópos, ezért szag- és nedvességátasoktól óvni kell. A felbontott csomagokat gondosan zárja vissza, és mielőbb használja fel.

ERBSLÖH Geisenheim GmbH • Erbslöhstraße 1 • 65366 Geisenheim, Germany
Tel.: +49 6722 708-0 • Fax: +49 6722 6098 • info@erbsloeh.com • www.erbsloeh.com

ERBSLÖH
Fortschritt macht Zukunft®

Az itt megadott alkalmazási ajánlások a helyes gyártási gyakorlat keretében ismertetik a termék technológiai segédeszközként vagy adalékanyagként történő tervezett felhasználását. Kizárólag ezzel a felhasználással érhető el a végtermék élelmiszer-biztonsága. Kérjük vegye figyelembe: termékismertetőink a legjobb tudásunk szerint készültek. Ezek kizárólag általános információként szolgálnak a termékeinkről. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre - ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknek fogva különbözőek - ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. A termékeink használatára vonatkozó helyi érvényű szabályok és biztonsági előírások ellenőrzése a felhasználó feladata. Ezért minden információt garancia nélkül adunk meg. A változtatás jogát fenntartjuk. Egyebekben általános szerződési feltételeink az irányadók. (letölthető: www.erbsloeh.com)
Verzió 005 – 09/2020 – Nyomtatva: 2023. 01. 25.